

# Lutte à la berce du Caucase



La berce du Caucase est une plante envahissante toxique. Elle représente un risque pour la santé humaine et pour l'environnement. Il est très important de limiter la propagation de cette plante, de ne jamais la vendre, la semer, la planter ou la multiplier. De plus, la berce du Caucase nuit à la croissance des plantes indigènes et peut entraîner une perte de biodiversité. Un plant mature fleurit et produit des graines entre sa 3<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> année de vie. Par la suite, il meurt. Les graines se propagent via le vent et les cours d'eau. Celles contenues dans le sol demeurent viables pendant environ 4 ans. L'éradication de la berce du Caucase est une lutte de longue haleine.

## Identification

**Plant :** 2 à 5 mètres de haut

**Tige :** robuste, tachetée de rouge ou de pourpre, 4 à 10 cm de diamètre, creuse, poils blancs rudes, épars, présents surtout à la base des tiges foliaires

**Inflorescence :** ombelles de 20 à 50 cm de diamètre composées de petites fleurs blanches (1 à 2 cm)

**Feuilles matures :** alternes, profondément découpées et dentées, face inférieure lisse à légèrement écailleuse.



## Étapes à suivre lors d'une observation

**Avant tout contact avec la berce du Caucase, protégez-vous des pieds à la tête.**

- 1) S'assurer de bien identifier la plante;
- 2) Signaler sa présence au MDDELCC : 1-800-561-1616
- 3) Si vous le pouvez, éliminez-la en utilisant une des options suivantes :
  - A) Sectionnez les racines à une profondeur de 20 cm sous la surface du sol à l'aide d'une pelle;
  - B) Coupez les inflorescences avant qu'elles portent des graines;
  - C) Contactez une entreprise spécialisée pour l'utilisation d'herbicides.
- 4) Détruire les résidus en les plaçant dans des sacs de plastique robustes et hermétiques placés au soleil pendant un minimum d'une semaine afin de supprimer la viabilité des semences.
- 5) Une fois les opérations terminées, retirez les vêtements en prenant soin de les retourner à l'envers et lavez-les simplement à la laveuse (ou au boyau d'arrosage dans le cas d'un imperméable).



### Attention !

Évitez la dispersion des graines.  
Ne pas composter la plante.  
N'utilisez pas d'herbicides en bande riveraine ou en milieu humide (interdit).

## Santé humaine

Sa sève contient des agents toxiques photosensibles appelés furocoumarines. À la suite d'un contact avec la peau combiné à une exposition au soleil, l'individu risque des lésions cutanées semblables à des brûlures (photodermatite). Afin d'en limiter les effets : laver rapidement la portion exposée et la couvrir pour diminuer l'exposition aux ultraviolets. Les rougeurs apparaissent dans les 48 h suivant l'exposition. Une photosensibilité peut être présente pendant plusieurs mois.

